



**NGHIỆM PHÁP LỘT NGÔI
CHỒM**

MỤC TIÊU:

- **Định nghĩa NPL.**
- **Chỉ định và chống chỉ định.**
- **Cách tiến hành và cách đánh giá kết quả.**



Định nghĩa - Chỉ định:



- **Là phương pháp giúp đánh giá cuộc sanh khi KC giới hạn, trọng lượng thai bình thường; hay KC bình thường, thai to.**
- **Chỉ thực hiện với ngôi chỏm và khi có chuyển dạ thật sự.**
- **KC giới hạn eo trên.**
- **KC bình thường, thai to.**
- **KC hẹp, thai nhỏ.**
- **Nói chung khi có nghi ngờ BXĐC.**

Chống chỉ định - Điều kiện:




- **KC hẹp hoàn toàn.**
 - **Thai suy.**
 - **Vết mổ cũ: tương đối.**
-
- **Ngôi chỏm.**
 - **Chuyển dạ giai đoạn hoạt động.**
 - **Có phòng mổ.**
 - **Theo dõi sát, phát hiện kịp thời những biến chứng.**

Cách tiến hành:

- **Khám LS xác giai đoạn chuyển dạ, ngôi thai, KC, tình trạng sức khỏe thai.**
- **Bấm ối, ghi giờ, đề phòng sa dây rốn.**
- **Điều chỉnh cơn gò tốt trước khi bấm ối, ghi giờ cơn gò tốt.**
- **Theo dõi cơn gò, TT, tình trạng CTC, ngôi thai sau 1 giờ và 2 giờ.**
- **Nếu gò nhiều phải giảm giọt oxytocin, nếu trương lực tăng phải dùng giảm gò cùng lúc.**



Đánh giá kết quả:



- ❖ **Trong quá trình theo dõi, nếu có biến chứng:**
 - **Cơn gò đồn dập, liên tục khi đã ngưng oxytocin và dùng giảm co.**
 - **Suy thai: ối xanh, TT có nhịp bất thường.**
 - **Sa dây rốn.**
 - **MLT cấp cứu.**
- ❖ **Sau 2 giờ:**
 - **Nếu CTC không mở thêm, cứng hơn hay phù nề nhiều.**
 - **Ngôi thai còn cao, có BHT, không lọt.**
 - **NPL thất bại, phải MLT.**
- ❖ **Sau 2 giờ:**
 - **CTC mở thêm 1 – 2 cm**
 - **Ngôi thai xuống thêm hay lọt vào tiểu khung**
 - **NPL có kết quả, theo dõi thêm chuyển dạ.**